

PROSTŘEDEK K PODPOŘE ZDRAVOTNÍHO STAVU ROSTLIN
S VÝRAZNÝM VEDLEJŠÍM ÚČINKEM PROTI HOUBOVÝM
CHOROBÁM ZEJMÉNA ZE SKUPINY PADLÍ



KONCENTRÁT
VYSTAČÍ AŽ
NA 30L POSTŘIKU

BIOAN

PROSTŘEDEK VYROBENÝ POUZE
Z POTRAVINÁŘSKÝCH SUROVIN

- Okurky, tykvovitá zelenina
- Vinná réva, růže
- Okrasné rostliny
- Angrešt, rybíz
- Rajčata, aj.



POVOLENO PRO BIOZAHRÁDKAŘENÍ
A BIOZEMĚDĚLSTVÍ
ŠETRNÝ KE ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM PODMÍNKÁM

NAŠE PŘÍPRAVKY

*

ZDRAVÉ VÝPĚSTKY

BIOAN

Pomocný prostředek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený ke zlepšení zdravotního stavu okurek a ostatní tykvovitě zeleniny, rajčat, angrešů, révy, růží a ostatních okrasných rostlin.

Účinná látka: Mléčný albumin a kasein min.10% (1,85 a 8,15%) Datum výroby a číslo šarže: (jsou totožné) lecitin min.20%

Výrobce: Agro*Bio, Rokycany 630/III

Balení: Lahvička 200ml (víčko 5ml)

Registrační číslo: 1516 - 1C

Doba použitelnosti: V původně uzavřeném obalu nejméně 12 měsíců od data výroby.

Působení: Prostředek k podpoře faktorů omezujících výskyt padlí. Působí dotykově, napadené části rostlin je třeba dokonale smáčet aplikační kapalinou (do začátku skapávání postřiku). **Vhodný zejména při současném použití biologické ochrany.**

Návod na použití:

Plodina	Škodlivý organismus	Dávka	Poznámka
Okurka, ostatní tykvovitá zelenina, rajče, angrešt, rybíz, réva, růže, ostatní okrasné rostliny aj.	Houbové choroby Padlí	0,5 - 3(5)% 1 - 10 víček na 1l vody (nejčastěji 1 - 3%) + smáčedlo	1

Poznámka č.1

Ošetřovat preventivně při ohrožení nebo při prvním výskytu. V těchto situacích použití koncentrací 0,5 - 1%. Při významném výskytu použít koncentraci 1 - 3(5)%. Ošetření je třeba opakovat dle potřeby v intervalu 4 - 10dní. Ošetřovat navečer, nebo za oblačného počasí, **ne za prudkého slunce a za vysokých teplot.** Při častějším použití a vyšších koncentracích doporučujeme po každé druhé aplikaci opláchnout /umýt/ ošetřené rostliny postřikem "jarovou vodou"(10 - 15kapek/1l), zejména na spodní straně listů.

Příprava aplikační kapaliny:

Obsah lahvičky důkladně protřepat a příslušné množství prostředku dokonale promíchat v postřikovači s vodou. K zajištění dobré účinnosti přidat na 1l aplikační kapaliny 5 - 7 kapek povoleného smáčedla (popřípadě "Jar" 10 - 15 kap.). **Kapalinu musí rostlinu smáčet**, ne stéci. Aplikační kapalinu spotřebovat do 24 hodin.

Likvidace zbytků a obalů:

Případné zbytky aplikační kapaliny zředit vodou a beze zbytku vystřik do bylinný porost pudy. Prázdné obaly od prostředku vypláchnout vodou a odevzdat do sběru.

Čištění aplikacního zařízení:

Po ukončení práce nádrž aplikacního zařízení vypláchnout vodou.

Ochranná lhůta:

(0 dnů.) Vyrobeno výhradně z potravinářských surovin

Výpěstky před konzumací omýt vodou.

Pozor!

Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami.

Může ohrozit zdraví při požití.

Prostředek nesmí být použit jinak, než je uvedeno v návodu.

Při práci není nutný ochranný oděv ani rukavice.

Zabraňte kontaminaci vody přípravkem.

Zasažené oči vypláchnout vodou.

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany

včel a zvěře. Pro ryby ve větší míře nebezpečný.

Skladování:

Skladovat v pevně uzavřené láhvi při teplotě 0 - 20°C.

Chraňte před přímým sluncem a před silnějšími mrazy.

